



จะทำอย่างไรหากถูกสุนัข
หรือแมวที่สงสัยว่าเป็น
โรคพิษสุนัขบ้ากัด

1

รับล้างบริเวณ
แผลด้วย สบู่
"ทันที"



2



รับไปพบแพทย์
เพื่อการวินิจฉัยและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคให้ทันท่วงที

3

รับกักสัตว์
เพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามอาการ



ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

การเก็บรักษาวัคซีน



วัคซีนจะต้องเก็บรักษา
ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส



ไม่นำวัคซีนไปแช่ในช่องแช่แข็ง
หรือช่องใต้ช่องแช่แข็ง และไม่นำ
วัคซีนมาวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น

หลีกเลี่ยงไม่ให้วัคซีนสัมผัสกับแสงแดด



กรณีนำวัคซีนไปใช้ให้บรรจุลงในกล่อง
รักษาความเย็นหรือกระเป๋าวัคซีน
ที่สามารถรักษาความเย็นให้อยู่ในระดับ
2-8 องศาเซลเซียส

วัคซีนจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำแข็ง
โดยตรง ต้องนำไปใส่ถุงพลาสติก
หรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการสัมผัส
น้ำโดยตรงก่อนบรรจุลงในกล่อง
รักษาความเย็น



กลุ่มควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 4181-2 www.dld.go.th



โรคพิษสุนัขบ้า
รู้ไว้...ป้องกันได้!



รักน้องหมา
อย่าลืมพาน้องไป **ฉีดวัคซีน**
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นะจ๊ะ





โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร ?



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเรบีส์ไวรัส (Rabies virus)

สัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้าง ?



สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งในประเทศไทยพบการเกิดโรคในสุนัขมากที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากทางไหนได้บ้าง ?

เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือข่วน หรือเข้าทางเยื่อตา ปาก จมูก ที่มีแผลหรือรอยฉีกขาดได้ ซึ่งสุนัขหรือแมวสามารถแพร่เชื้อผ่านทางน้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิดอาการภายในกี่วัน ?



ไม่แน่นอน ระยะเวลาการเกิดโรคขึ้นอยู่กับบริเวณที่โดนกัดว่าใกล้เส้นประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วรักษาหายได้หรือไม่ ?



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิตเท่านั้น สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน



สุนัขต้องได้รับการฉีด **วัคซีน** ครั้งแรกที่อายุ 12 สัปดาห์ เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี



อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีแสดงอาการออกมาทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม ซึ่งแบบดุร้ายจะสามารถสังเกตอาการได้ชัดเจนคือ สัตว์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดุร้ายมากขึ้น สัตว์ที่โดยปกติจะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่เงียบๆ แสดงอาการทางระบบประสาท กระวนกระวาย กัดแทะสิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า คางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก

โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะหน้าร้อนใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่
โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ **ตลอดทั้งปี**